

Zuweisung für eine dritte Impfdosis bzw. Auffrischimpfung (Booster) bei Personen < 65 Jahren durch die/den behandelnde/n Ärztin/Arzt

Covid-19-Impfung am kantonalen Impfzentrum in Baar

1. Angaben zur Person

Vorname und Name: _____

Adresse: _____

Geburtsdatum: _____

2. Bestätigung und Unterschrift durch die behandelnde Ärztin / den behandelnden Arzt

Die/der Unterzeichnende bestätigt hiermit, dass der oben genannte Person eine dritte Impfdosis bzw. Auffrischimpfung (Booster) aufgrund der folgenden Indikation verabreicht werden soll:

- Vervollständigung der Grundimmunisierung mit einer dritten Impfdosis bei schwer immundefizienten Personen (Details siehe unten)
- Auffrischimpfung bei Bewohnerinnen/Bewohner und Betreute in Altersheimen, Pflegeheimen sowie Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen im Alter (Details siehe unten)
- Auffrischimpfung bei besonders gefährdeten Personen (BGP) mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko (Details siehe unten)
- Auffrischimpfung bei Gesundheitsfachpersonen in besonders exponierten Versorgungsbereichen (z. B. Covid-Stationen, Intensivstationen) und Pflege- und Betreuungspersonal in Altersheimen oder Pflegeheimen für Menschen im Alter (Details siehe unten)

Ort und Datum

Unterschrift und Stempel der Ärztin/des Arztes

Dieses Formular muss ausgefüllt und unterzeichnet zusammen mit dem Covid-19-Impfnachweis und/oder Covid-19-Impfzertifikat zur Impfung mitgebracht werden!

Indikationen für die Verabreichung einer dritten Impfdosis bzw. einer Auffrischimpfung (Booster)

Schwer immundefiziente Personen ab Alter 12 Jahren (Vervollständigung der Grundimmunisierung mit einer dritten Impfdosis, mindestens 4 Wochen nach der letzten verabreichten Impfdosis):

- Personen, welche zum Zeitpunkt der Covid-19 Impfung unter einer der folgenden schwer immunsupprimierenden Behandlungen standen:
 - B Zell Depletion (z.B. Rituximab, Ocrelizumab, Cyclophosphamid),
 - Hochdosis-Chemotherapie,
 - Kortikosteroidtherapie >20mg Prednison/Tag, >2 Wochen,
 - weitere Therapien, die zu einer schweren Immunsuppression führen (z.B. Mycophenolat, Ciclosporin, Januskinase-Inhibitoren u.ä.),
 - Kombinationstherapie verschiedener immunsupprimierender Medikamente.
- Empfänger für Solid Organtransplantation
- Personen mit einem angeborenem Immundefekt mit eingeschränkter B- und T-Zellfunktion (z. B. common variable immunodeficiency; CVID, isolierte CD4-Lymphozytopenie u.ä.).

Bewohnerinnen/Bewohner und Betreute in Altersheimen, Pflegeheimen sowie Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen im Alter (Auffrischung = Booster, frühestens 6 Monate nach der letzten verabreichten Impfdosis):

- mit Alter < 65 Jahren

Besonders gefährdete Personen (BGP) mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko (Auffrischung = Booster, frühestens 6 Monate nach der letzten verabreichten Impfdosis):

- im Alter von 16 bis < 65 Jahren gemäss folgender Tabelle (* = Wenn nicht anders spezifiziert, gelten diese Krankheitsdefinitionen für Personen ab dem Alter von 16 Jahren. / ** = Die Impfindikation muss nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch die betreuende Fachärztin/den betreuenden Facharzt getätigt werden.):

Erkrankungsgruppe / Chronische Krankheiten mit höchstem Risiko *	
Herzerkrankung	- Chronische Herzinsuffizienz ab NYHA II - Symptomatische chron. ischämische Herzkrankheit trotz medizinischer Therapie
Arterielle Hypertonie	- Therapieresistente (> 160 mmHg) Hypertonie oder Hypertonie mit kardialen Komplikationen oder anderen Endorgan-Schäden
Atemwegs-Erkrankung	- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ab GOLD II - Emphysem/schwere Bronchiektasen - Interstitielle Pneumopathie/Lungenfibrose - Krankheiten mit einer schwer verminderten Lungenkapazität
Lebererkrankung	- Leberzirrhose mit Dekompensation in der Vorgeschichte
Nierenerkrankung	- Schwere, chronische Niereninsuffizienz ab GFR < 30ml/min
Diabetes mellitus	- Diabetes mellitus (Typ 1 oder 2) mit relevanten Organschäden; oder schlecht eingestellt (HbA1c ≥ 8 %)
Adipositas	- Erwachsene mit einem BMI von ≥ 35 kg/m ²
Immundefizienz**, angeboren oder erworben durch Erkrankung** oder immunsuppressive Therapie**	Relevante Immundefizienz bei - malignen hämatologische Erkrankungen - Neoplasien/Krebserkrankungen unter aktiver Therapie - immun-vermittelten entzündlichen Erkrankungen (z.B. systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis, Psoriasis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen), welche eine immunsuppressive Therapie erhalten (inkl. Prednisolon-Äquivalent > 20 mg/Tag, steroidsparende Therapien und Biologika) - HIV-Infektion- ab CD4 ⁺ T Zellzahl < 200/μL - Organtransplantierte, Knochenmark- oder Stammzell-Transplantierte sowie Personen auf einer Warteliste für Transplantationen
Trisomie 21	Erwachsene (ab 18 Jahre) mit Trisomie 21

Gesundheitsfachpersonen in besonders exponierten Versorgungsbereichen (z. B. Covid-Stationen, Intensivstationen) und Pflege- und Betreuungspersonal in Altersheimen oder Pflegeheimen für Menschen im Alter (Auffrischung = Booster, frühestens 6 Monate nach der letzten verabreichten Impfdosis):

- Auf persönlichen Wunsch hin kann die Auffrischung im Einzelfall und nach gemeinsamer Nutzen-Risiko-Analyse mit der zuständigen Ärztin/dem zuständigen Arzt verabreicht werden. Eine Auffrischung in diesen Einzelfällen erfolgt off-label (ausserhalb Zulassung durch Swissmedic).